

¿QUIÉN ES QUIÉN?

ÚLCERA DE MARTORELL, PIODERMA GANGRENOSO Y CALCIFILAXIS.

ÚLCERA DE MARTORELL

Etiología no del todo conocida. Hipertrofia y obstrucción de pequeñas arteriolas. Se asocia a HTA, DM...

Zonas pigmentadas, cianóticas que se ulceran o tras traumatismo. Cara anterolateral, tercio distal pierna y supramaleolar, tendón de aquiles. Bilaterales, simétricas o unilaterales.

Lecho fibrinoide y/o necrótico. Bordes irregulares, hiperémicos, necróticos. Dolor punzante, intenso, continuo. Desbridamiento selectivo.



PIODERMA GANGRENOSO

Etiología desconocida. Dermatitis neutrofílica inflamatoria. Se relaciona con enf inflamatoria intestinal, artritis reumatoide...

Nódulo eritematoso o lesiones vesiculopustulosas que tienden a ulcerarse. EEl, zona pretibial únicas o múltiples, otras localizaciones

Lecho con necrosis, tejido de granulación. Bordes irregulares, elevados, aspecto violáceo. Muy dolorosas. Contraindicado desbridamiento en fase inflamatoria.



CALCIFILAXIS

Arteriopatía urémica calcificante. Se relaciona con niveles altos de PTH, ERC, diálisis y/o FG < 15 ml/min.

Fibrinoide y/o necrótico. Bordes irregulares, extensos. Muy dolorosas. Desbridamiento cortante y larval.

Nódulos subcutáneos y placas violáceas purpúricas que se necrosan y se ulceran. En tobillo, pantorrilla, tronco, nalgas, pene.

